



WYGRAJ Z BÓLEM

- Potrójny profil działania (przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, przeciwzapalny)
- Innowacyjny gotowy do użycia roztwór ibuprofenu (RTU) zawierający argininę
- Do stosowania na wszystkich etapach leczenia bólu okołoperacyjnego
- Znajduje się na Liście Leków Podstawowych WHO
- Znajduje się w polskich Zaleceniach Uśmierzania Bólu Pooperacyjnego (2019)

Ibuprofen B. Braun

PIERWSZY NA RYNKU GOTOWY DO UŻYCIA
ROZTWÓR INFUZYJNY

Ibuprofen B.Braun z Arginina

Innowacyjny Ibuprofen do podaży infuzyjnej.

- Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Ibuprofenu zostały potwierdzone na przełomie wielu lat jego stosowania¹, a substancja jest wymieniona na obowiązującej Liście Leków Podstawowych opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w różnych dawkach i postaciach.² Modelowa lista WHO zawiera najbardziej skuteczne, bezpieczne i przystępne cenowo leki stosowane w zakresie podstawowych wskazań.
- Ibuprofen znajduje się w polskich Zaleceniach Uśmierzania Bólu Pooperacyjnego 2019 wydanych przez Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu⁹

Korzyści wynikające ze stosowania Ibuprofenu B. Braun :

1. Potrójny profil działania:
 - Przeciwbólowy
 - Przeciwgorączkowy
 - Przeciwzapalny⁴
2. Może być stosowany na wszystkich etapach leczenia bólu okołopooperacyjnego
3. Zawiera argininę która:
 - Ogranicza wystąpienie ewentualnych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego a szczególnie układu żołądkowo – jelitowego⁵
 - Zwiększa efekt przeciwzapalny⁶
 - Ma także właściwości przeciwbólowe^{7,8}
4. Ibuprofen podawany dożylnie jest biorównoważny z postacią doustną³ w związku z czym możliwe jest przejście po 3-ch dniach podaży na postać doustną

Ibuprofen B. Braun dostępny jest w dawce:

400 mg – 4 mg/ml w opakowaniu 100 ml wskazanym do stosowania u pacjentów dorosłych, w celu:

- Krótkotrwałego leczenia objawowego ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu
- Krótkotrwałego leczenia objawowego gorączki

600 mg – 6 mg/ml w opakowaniu 100 ml wskazanym do stosowania u pacjentów dorosłych, w celu:

- Krótkotrwałego leczenia objawowego ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu

Ibuprofen w połączeniu z Arginina



Skuteczny lek przeciwbólowy



Skuteczny lek przeciwgorączkowy



Działanie przeciwzapalne



Ochrona żołądka

Ibuprofen B. Braun

Gotowy do użycia lek w opakowaniu typu Ecoflac® plus

Korzyści wynikające ze stosowania leku w opakowaniu typu Ecoflac® plus

- Dwa niezależne, jednakowe porty niewymagające dezynfekcji przy pierwszym ich użyciu
- Średnica portu infuzyjnego powyżej 6 mm, możliwości zastosowania wszystkich aparatów infuzyjnych dostępnych na rynku
- Identyfikacja nazw roztworów na etykietach różnymi kolorami, łatwa identyfikacja preparatu i ograniczenie ryzyka błędów .
- Pojemnik w pełni zapadalny bez potrzeby zewnętrznego napowietrzania, spełniający definicję pojemnika w systemie zamkniętym.
- Gotowy do użycia roztwór leku w pojemniku Ecoflac® plus jest zgodny z obowiązującą Rezolucją Unii Europejskiej CM/Res/2016

- 1 Zatyczka typu „Twin cap”, dwa oddzielne identyczne porty
- 2 Zabezpieczenie przed przekłuciem
- 3 Mocny uchwyt umożliwiający wieszanie pojemnika



BIBLIOGRAFIA

1. Rainsford KD, Inflammopharmacology 2009; 17:275–342.
2. WHO Model List of Essential Medicines, 20th edition, March 2017, amended August 2017), www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/
3. EudraCT: 2012-003264-53 (data on file); EudraCT: 2013-004877-28 (data on file).
4. Ulufer Sivrikaya G (2012); Multimodal Analgesia for Postoperative Pain Management, Pain Management –Current Issues and Opinions, Dr. Gabor Racz (Ed.), ISBN: 978-953-307-813-7.
5. Jimenez D et al., Digestive Diseases and Sciences 2002; 47(1): 44–53.
6. De palma C et al., Pharmacol. Res. 2009; 60(4): 221–8.
7. Moore PK et al.; Br. J. Pharmacol. 1991; (102): 198–202.
8. Kawabata A et al.; Br. J. Pharmacol. 1993; (109): 73–79.
9. Jerzy Wordliczek, Renata Zajączkowska, Adam Dziński, Marek Jackowski, Piotr Richter, Jarosław Woroń, Hanna Misiólek, Jan Dobrogowski, Krzysztof Paśnik, Grzegorz Wallner 2019; Polski Przegląd Chirurgiczny 2019; 91 (1): 52–74 Postoperative pain relief in general surgery – recommendations of the Association of Polish Surgeons, Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy, Polish Association for the Study of Pain and Polish Association of Regional Anaesthesia and Pain Treatment

Produkt	Rodzaj opakowania	Stężenie (mg / ml)	Objętość (ml)	Ilość sztuk w opakowaniu
Ibuprofen B. Braun 400 mg Roztwór do infuzji	Ecoflac® plus	4	100	20
Ibuprofen B. Braun 600 mg Roztwór do infuzji	Ecoflac® plus	6	100	20

HC-PH2-025 10/2019