



wyroby medyczne

Łagodne wsparcie na przewlekłe zaparcie

DulcoSoft
saszetki



wygodne saszetki, które wszędzie można ze sobą zabrać

DulcoSoft
250 ml



roztwór do rozpuszczania w ulubionym napoju, w dużym rodzinnym

DulcoSoft Junior
100 ml



roztwór, w mniejszym opakowaniu, dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia

Dawkowanie

przyjmowane najlepiej w pojedynczej dawce rano

Dorośli i dzieci powyżej 8. r.ż. - saszetki

1-2 saszetki na dobę, rozpuszczone w płynie

Dorośli i dzieci powyżej 8. r.ż. - roztwór

20-40 ml

Dzieci od 4 do 7 lat* - roztwór

16-32 ml

Dzieci od 2 do 3 lat* - roztwór

8-16 ml


Dzieci powyżej 6. miesiąca życia* - roztwór

8 ml

Wyrób medyczny. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją stosowania.

Bristolska skala uformowania stolca

Typ 1.




Pojedyncze zbite grudki podobne do orzechów, trudne do wydalenia

Typ 2.



Stolec o wydłużonym kształcie, grudkowaty

Typ 3.




Stolec wydłużony, z pęknięciami na powierzchni

Typ 4.




Smukłe, węzowate kawałki stolca, gładkie i miękkie

Typ 5.




Miękkie drobinny z wyraźnymi krawędziami (łatwo wydalane)

Typ 6.



Kłaczaste kawałki z postrzępionymi krawędziami

Typ 7.



Wodnisty, bez stałych elementów (ciecz)

Opracowano na podstawie:

Wojtyniak K., Szajewska P. Translation to Polish, cross-cultural adaptation, and validation of the Bristol Stool Form Scale among healthcare professionals and patients. Gastroenterology Rev 2018; 13 (1): 35-39.

DulcoSoft Junior® (makrogol 4000) roztwór, jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu zaparć oraz do zmiękczenia twardych mas kałowych. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 8. roku życia: 20 - 40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10 - 20 g makrogolu 4000), Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16 - 32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8 - 16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8 - 16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 - 8 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 1 roku: 8 ml (co odpowiada 4 g makrogolu 4000) najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. Dystrybutor: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

DulcoSoft® (makrogol 4000) roztwór jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu zaparć oraz do zmiękczenia twardych mas kałowych. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia: 20 - 40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10 - 20 g makrogolu 4000), Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16 - 32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8 - 16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8 - 16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 - 8 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 1 roku: 8 ml (co odpowiada 4 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. Dystrybutor: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

DulcoSoft® (makrogol 4000) proszek do sporządzania roztworu doustnego, wyrób medyczny wskazany do stosowania w objawowym leczeniu zaparć, w celu ułatwienia wypróżnienia i uzyskania naturalnego poczucia ulgi. Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wieku od 8 lat: 1 - 2 saszetki na dobę, rozpuszczone w płynie (co odpowiada 10 - 20 g makrogolu 4000), przyjmowane najlepiej w pojedynczej dawce rano. Instrukcja stosowania styczeń 2016.