


# Propozycja realizacji PSO z użyciem szczepionki Infanrix hexa.<sup>1,3</sup>



## Infanrix hexa - udokumentowana szeroka możliwość jednoczesnego podawania z innymi szczepionkami.<sup>1,4</sup>

szczepionka przeciw meningokokom grupy B (Men B) - **Bexsero**

sconiugowane szczepionki przeciw pneumokokom np. **Synflorix**

szczepionka przeciw ospie wietrznej - **Varilrix**

# Infanrix<sup>®</sup> hexa

doustne szczepionki przeciw rotawirusom np. **Rotarix**

sconiugowana szczepionka przeciw meningokokom typu A, C, W-135 i Y (koniugat TT)

szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej


# Infanrix hexa



Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana)

## Infanrix hexa to szczepionka 6w1 z potwierdzonym w badaniach klinicznych profilem bezpieczeństwa i skutecznością u dzieci w wieku od 6 tygodni do 36 miesięcy<sup>1</sup>

- ✓ pozwala maksymalnie uprościć realizację PSO<sup>2</sup>
- ✓ zmniejsza liczbę wizyt szczepiennych i wkluć<sup>2</sup>
- ✓ ułatwia przeprowadzenie tzw. szczepień wyrównawczych<sup>1-3,\*</sup>



\*U niemowląt i dzieci do 36 m.ż. w przypadku nie przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych w terminach wskazanych w PSO

Działania niepożądane obserwowane najczęściej ( $\geq 1/10$ ) po podaniu Infanrix hexa: utrata apetytu, nietypowy płacz, drażliwość, niepokój, senność, gorączka  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ; ból, zaczerwienienie, zlokalizowany obrzęk w miejscu podania ( $\leq 50$  mm).<sup>1</sup> Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo wcześnie urodzonym wcześniakom (urodzonym  $\leq 28$ . tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to niemowląt, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tych niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odradzać.<sup>1</sup>

Referencje: 1. ChPL Infanrix hexa pl.gsk.com [dostęp: styczeń 2022]. 2. Ludwikowska K., Szenborn L. Standardy Medyczne/Pediatrya 2020; 17: 708-712. 3. Program Szczepień Ochronnych na rok 2022. <https://www.gov.pl/web/gis/program-szczepien-ochronnych-na-rok-2022> [dostęp: styczeń 2022]. 4. ChPL Varilrix pl.gsk.com [dostęp: styczeń 2022].

Infanrix hexa jest nazwą zastrzeżoną. Wydaje się z przepisu lekarza. Przed przepisaniem i zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Pełna wersja aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego dostępna jest na stronie pl.gsk.com. Dalsze informacje o leku dostępne na życzenie: GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymotowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. 22 576 90 00, fax 22 576 90 01, prowadzący reklamę leku na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego. Znaki towarowe stanowią własność spółek z grupy GSK lub przedmiot licencji im udzielonych. ©2021 Spółki z grupy GSK lub ich licencjodawcy. PIM-PL-INH-LBND-XXXX, styczeń 2022

