



Schemat dawkowania szczepionki BEXSERO¹



Opcjonalny schemat 3+1



UWAGA! 1 dawka = 0,5 ml.

Bexsero – praktyczne informacje

Bexsero iniekcja głęboko domięśniowa

Bexsero można podawać jednocześnie ze szczepionkami pediatrycznymi – zarówno monowalentnymi, jak i skojarzonymi¹:

Men A, C, W, Y	DTaP	5w1 / 6w1	PCV7
MMR	V	HiB, polio, WZWB	

Profilaktyczne zastosowanie paracetamolu tuż przed lub tuż po szczepieniu^{1*}

- Zmniejsza częstość i stopień ciężkości gorączki^{1*}.
- Nie ma istotnego wpływu na immunogenność Bexsero oraz standardowych szczepionek.

¹Nie badano wpływu na odpowiedź immunologiczną środków przeciwgorączkowych innych niż paracetamol.

²Zaleca się podanie profilaktyczne trzech dawek paracetamolu. Przy czym pierwszą dawkę paracetamolu powinno się podawać równoległe ze szczepieniem, a następnie dwie dodatkowe dawki zaleca się podawać w odstępie 4-6 godzin².

Bexsero – profil bezpieczeństwa¹

• Bezpieczeństwo stosowania oceniono w 17 badaniach, w tym 10 randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem 10565 osób¹.

• **Działania niepożądane:** najczęściej obserwowane działania niepożądane w badaniach klinicznych (bardzo często ≥1/10): Gorączka ≥38°C, drażliwość, tkliwość i rumień w miejscu wstrzyknięcia¹.

¹ Charakterystyka produktu leczniczego Bexsero, dostęp na: <https://pl.gsk.com/pl-pl/produkty/szczepionki/bexsero/>

² Isitt C et al. Arch Dis Child. 2020; Published online ahead of print:doi:10.1136/archdischild-2019-3180/ BEXSERO; dane z praktyki klinicznej. Przewodnik po danych dla Bexsero uzyskanych w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej (RWE: Real World Evidence), październik 2021.

PM-PL-BEX-STKR-230001, maj 2023



