

CERVARIX - schemat szczepienia¹

GSK



9 urodziny



15 urodziny



Wiek przy podaniu pierwszej dawki

Schemat szczepienia

9 do 14 lat włącznie*

2 dawki: 0, 5-13 miesięcy

15 lat i powyżej

3 dawki: 0, 1, 6 miesięcy**

Cervarix jest przeznaczony do wstrzykiwań domięśniowych w okolicę mięśnia naramiennego¹

*Jeżeli druga dawka szczepionki zostanie podana przed upływem 5. miesiąca od pierwszej dawki, konieczne jest podanie trzeciej dawki szczepionki.

**Jeśli konieczna jest elastyczność schematu szczepienia, druga dawka może zostać podana w okresie 1 do 2,5 miesiąca po podaniu pierwszej dawki, a trzecia dawka w okresie od 5 do 12 miesięcy po podaniu pierwszej dawki.

Najczęstsze działania niepożądane obserwowane po podaniu szczepionki Cervarix: Bardzo często ($\geq 1/10$): reakcje w miejscu podania w tym: ból, zaczerwienienie, obrzęk; zmęczenie, ból głowy, bóle mięśniowe. Często (od $\geq 1/100$ do $< 1/10$): dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha; swędzenie/świąd, wysypka, pokrzywka, bóle stawowe, gorączka ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)¹.

Referencja: 1 ChPL Cervarix pl.gsk.com [dostęp: październik 2023].

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

PM-PL-CER-STKR-230003, październik 2023



