

Ustawienie zalecanej dawki na wstrzykiwaczu

Przykładowy schemat dawkowania¹

NGENLA 24 mg


Dla dawek ≤12 mg/tydzień

NGENLA 24 mg

(przeskok co 0,2 mg)

Liczby w kolorze fioletowym oznaczają przyrosty dawki, pokazane jako czarne cyfry na wstrzykiwaczu

Inne przyrosty dawki są przedstawione na wstrzykiwaczu w formie kreski



Charakterystyka Produktu Leczniczego Ngenla



Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16 B, 02-092 Warszawa
Kapitał zakładowy 33.860.000 zł
KRS 000022310 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
NIP 5213115586 BDO 000189470

Przepisana dawka (mg/tydzień)	Pełne dawki we wstrzykiwaczu*	Pozostałość we wstrzykiwaczu po zużyciu wszystkich pełnych dawek(mg)
5.0	4	4.0
5.2	4	3.2
5.4	4	2.4
5.6	4	1.6
5.8	4	0.8
6.0	4	0
6.2	3	5.4
6.4	3	4.8
6.6	3	4.2
6.8	3	3.6
7.0	3	3.0
7.2	3	2.4
7.4	3	1.8
7.6	3	1.2
7.8	3	0.6
8.0	3	0
8.2	2	7.6
8.4	2	7.2
8.6	2	6.8
8.8	2	6.4
9.0	2	6.0
9.2	2	5.6
9.4	2	5.2
9.6	2	4.8
9.8	2	4.4
10.0	2	4.0
10.2	2	3.6
10.4	2	3.2
10.6	2	2.8
10.8	2	2.4
11.0	2	2.0
11.2	2	1.6
11.4	2	1.2
11.6	2	0.8
11.8	2	0.4
12.0	2	0

* Jeśli od daty pierwszego użycia minęło więcej niż 28 dni, wstrzykiwacz musi zostać zutyliзовany, nawet jeśli zawiera niewykorzystany produkt leczniczy. Ten sam wstrzykiwacz można użyć maksymalnie 5 razy w ciągu tego 28-dniowego okresu.

Ustawienie zalecanej dawki na wstrzykiwaczu

Przykładowy schemat dawkowania¹

NGENLA 60 mg

Dla dawek ≤30 mg/tydzień


NGENLA 60 mg

(przeskok co 0,5 mg)



Liczby w kolorze niebieskim oznaczają przyrosty dawki, pokazane jako czarne cyfry na wstrzykiwaczu

Inne przyrosty dawki są przedstawione na wstrzykiwaczu w formie kresiek.



Przepisana dawka (mg/tydzień)	Pełne dawki we wstrzykiwaczu*	Pozostałość we wstrzykiwaczu po zużyciu wszystkich pełnych dawek(mg)
12.0	5	0
12.5	4	10.0
13.0	4	8.0
13.5	4	6.0
14.0	4	4.0
14.5	4	2.0
15.0	4	0
15.5	3	13.5
16.0	3	12.0
16.5	3	10.5
17.0	3	9.0
17.5	3	7.5
18.0	3	6.0
18.5	3	4.5
19.0	3	3.0
19.5	3	1.5
20.0	3	0
20.5	2	19.0
21.0	2	18.0
21.5	2	17.0
22.0	2	16.0
22.5	2	15.0
23.0	2	14.0
23.5	2	13.0
24.0	2	12.0
24.5	2	11.0
25.0	2	10.0
25.5	2	9.0
26.0	2	8.0
26.5	2	7.0
27.0	2	6.0
27.5	2	5.0
28.0	2	4.0
28.5	2	3.0
29.0	2	2.0
29.5	2	1.0
30.0	2	0

* Jeśli od daty pierwszego użycia minęło więcej niż 28 dni, wstrzykiwacz musi zostać zutytylizowany, nawet jeśli zawiera niewykorzystany produkt leczniczy. Ten sam wstrzykiwacz można użyć maksymalnie 5 razy w ciągu tego 28-dniowego okresu.

Charakterystyka Produktu Leczniczego Ngenla



Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16 B, 02-092 Warszawa
 Kapitał zakładowy 33.860.000 zł
 KRS 0000022310 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
 NIP 5213115586 BDO 000189470